

Sechsstreifen-Langschwanzzeichse

Takydromus sexlineatus

Schutzstatus

nicht geschützt

Verbreitung

Südost-China, Hainan, Vietnam, Laos, Kambodscha, Myanmar, Thailand, Malaysia und Indonesien (z. B. Sumatra, Borneo, Bangka, Java)

Lebensraum

grasige Flächen der tropischen Hügelländer, tagaktiv.

Größe

bis 36 cm

Lebenserwartung

etwa 4 Jahre

Fortpflanzung

legt bis zu 5 weichschalige Eier, mehrere Gelege pro Jahr möglich. Zeitigungsdauer bei 25 °C etwa 30-45 Tage

Temperatur

grasige Flächen der tropischen Hügelländer, tagaktiv.

Luftfeuchtigkeit

60-80%

Beleuchtung

Tageslichtleuchtstoffröhren und UV Röhren (siehe Leuchtstoffröhren). Für ausreichende UV Strahlung empfiehlt sich die Arcadia D3 Compact. Spotstrahler für die Schaffung lokaler Wärmepunkte.

Bodengrund

lockeres, saugfähiges Substrat (siehe Bodensubstrat).

Einrichtung

Klettermöglichkeiten, viele Versteckmöglichkeiten. Bepflanzung möglich (Ficus benjamina, F. pumila Scindapsus etc.)

Futter

Insekten (z. B. kleine Grillen, Heimchen, Heuschrecken, Schaben, Wachsmotten, etc.) auch Produkte der Zoo Med Can o' Serie. Regelmäßige Mineralien- und Vitaminzugaben sind unerlässlich.

Literatur

SCHLÜTER, U. (2003): Die Langschwanzzeichsen der Gattung Takydromus. Kirschner & Seuffer Verlag, Keltern-Weiler, 110 S.

